




Chouette épervière

Northern Hawk Owl, *Surnia ulula*



IDENTIFICATION

Sa longue queue et sa silhouette rappellent celles d'un épervier. Ses disques faciaux sont bordés de noir et réduits comparativement aux autres chouettes. Son plumage pâle est fortement rayé de brun sur la poitrine et tacheté sur le dos. Ses ailes sont courtes et pointues. Elle n'a pas d'aigrettes sur la tête.

36-43 cm



ÉCOLOGIE

Alimentation

Elle se nourrit surtout de petits rongeurs et quelquefois d'oiseaux et d'insectes. Il arrive également qu'elle complète son menu avec des grenouilles ou du poisson. Cette petite chouette est essentiellement diurne. Son vol particulier se compose de plusieurs battements d'ailes rapides suivis d'un court vol plané. Elle est la seule chouette capable de voler sur place.

Reproduction

Elle fait son nid dans les cavités des troncs d'arbres cassés ou créés par les pics. Les jeunes prennent leur premier envol vers l'âge de 4 à 5 semaines. Ils dépendent des parents jusqu'à l'âge de 3 mois. Le développement des petits est très rapide et leur taux de survie est assez élevé : dès l'âge de 3 à 4 semaines, les oisillons ont déjà atteint 78 % du poids d'un adulte! Les parents cachent de la nourriture sur leur territoire pour assurer l'alimentation des jeunes. Ils peuvent ainsi survivre aux conditions imprévisibles des régions nordiques.

RÉPARTITION

Elle niche au nord du Canada, jusqu'à la limite de la forêt, davantage dans les forêts boréales ouvertes. Durant l'hiver, lorsqu'elle nous rend visite dans le sud du Québec, la chouette épervière fréquente les forêts de conifères ou mixtes à proximité d'éclaircies comme un champ, une tourbière ou un lac.

STATUT ET POPULATION

L'espèce est désignée en sécurité! Sa population semble avoir peu varié depuis les années 1970. En effet, se reproduisant dans les régions éloignées et inaccessibles, il est difficile de maintenir un suivi précis de sa population.

¹ Rapport Espèces sauvages du Canada, 2015

